



Jac BOUTAUD

Tige



Cépée

T. Lamant

*Rhamnus* : du grec *rhamnos*, le nom de plusieurs espèces de nerpruns.

*alaternus* : ancien nom de cette espèce en latin

*Rhamnus alaternus* est un arbuste persistant aux petites feuilles vert foncé, résistant bien aux situations chaudes et sèches.



JB

Feuille persistante (2 à 5 cm)



T. Lamant

Fruits rouges puis noirs



JB

Ecorce

**Port** : arbuste au port arrondi, dense, aux branches noueuses. La cépée est sa forme naturelle la plus adaptée. Il est cependant possible de le conduire en tige remontée à condition de l'accompagner dans sa croissance lente.

**Rameaux** : brun rouge.

**Ecorce** : grise se fendillant en petites plaques grisâtres.

**Feuillage** : persistant. Feuilles ovales de 2 à 5 cm de long. Elles sont coriaces, vert sombre brillant dessus, plus clair et mat dessous. Elles ont une odeur aromatique (parfum de miel).

**Floraison** : en mars avril petites fleurs jaunâtres, chacune mâle ou femelle sur la même plante, en petits bouquets axillaires.

**Fructification** : en octobre novembre présence de fruits globuleux de 5 à 6 mm de diamètre, rouges puis noirs. Non comestibles.

**Climat** : résistance moyenne au froid. Il apprécie le plein soleil et accepte la mi-ombre. Par contre, l'ombre ne lui convient pas.

**Usages et comportement** : sa croissance est lente et il vit environ 150 ans. Il peut être planté isolé, en étage haut de massif ou en haies libres. Plante médicinale. Il résiste bien aux embruns.

**Sol** : il supporte presque tous les types de sols (superficiels, compacts, légers, acides ou basiques et secs) par contre les substrats gorgés d'eau de façon temporaire ou permanente ne lui conviennent pas. A l'état sauvage, il se développe préférentiellement en sols basiques à neutres et plutôt secs.

**Origine** : indigène dans la moitié sud de la France, en Europe méridionale, en Asie occidentale et en Afrique du Nord.

**Conseils pour la plantation** : il n'est pas disponible dans toutes les pépinières en forme libre et il est rare en tige. Il est recommandé de le planter en motte au printemps ou en automne comme tous les persistants.

**Taille de formation** : il est long à conduire du fait de sa croissance lente. Pour monter une tige, éliminer progressivement les basses branches tout en sélectionnant une flèche dominante, et être patient ...

**Anecdote** : bois d'odeur peu agréable néanmoins utilisé pour les marqueteries et petits objets façonnés.

**Essence apparentée** : *Rhamnus alaternus* 'Argenteovariegata' est un peu moins grand et a des feuilles marginées de blanc crème.

**Collection de référence visible à** :  
Jardin Botanique de Strasbourg - 28 rue Goethe 67083 Strasbourg Cedex

